



As bandadas de estorniños, tamén se ameasen a desaparecer. No uso se o cambio climático é moderado, cunha subida de tres graus curante os próximos cen anos.

Moitas especies son migratorias en por si, pero o quecemento global supoñerá un reto para todas elas, e algunas mesmo deberán abandonar os seus tradicionais lares por novas terras, onde a adaptación non estará garantida se non atopan medios de sustento

O CAMBIO CLIMÁTICO TRAERÁ GRANDES MIGRACIÓN DE AVES

E.D. • Madrid

O quecemento global provocaría que as 430 especies de aves que crían en Europa se desplacen, c. e media, uns 550 quilómetros cara o norte -unha extensión equivalente a metade da península ibérica- ata finais de século e que ocupen unha superficie un 20 por cento menor que a actual.

Estas son as predicións presentadas no Atlas Clírico das Aves Re-

cemento global: moderado -cunha subida de tres graos nos próximos cen anos.

España será un dos territorios mais sensibles ós efectos deste cambio climático, xa que no sur da Península poderán desaparecer entre o 40 e o 50 por cento das especies de aves no mellor dos casos, é dicir, cando as aves rosen perfectamente capaces de desprazarse coas condicións climáticas.

O estudo foi realizado polos catedráticos e doutores das universi-

ades británicas de Durham e Cambridge Brian Liu, Helen Thys Greet, Vicki, Colli, Graham e Steve Willis.

A águia imperial, afirmou o director do SEO/BirdLife, deixaría prácticamente de verse en España e, ainda que en teoría podería emigrar a Francia, "esta especie é moi malha colonizadora" e é difícil que se adaptaría mal ó cambio do clima.

A pita do monte (*Tetrao uro gallus*), a enaraña (*Perdix perdix*) e a laverca (*Alauda arvensis*) desaparecerían da Península,

de acordo coas simulacións, e as poboacións ibéricas de avetarda (*Otis tarda*) e sisón (*Otis tetrix*) vermianse decimadas.

A algunas especies, con todo, o cambio das temperaturas e a nu-

paliar estes efectos, Sánchez avoga por abrir corredores biolóxicos na Península que lles permitan ás especies migrar "segundo" o clima: "as aves poden voar, pero de nada lles serve se non se moen os

POLA CONTRA, NA NOVA SITUACIÓN, AS BUBELAS VÉRIANSE EFENEFICIADAS Á HORA DE COLOCAR AS ZONAS MÁIS CÁLIDAS

midade sentaríalles ben, como os casos da bubela (*Upupa epops*) e o abelleiro (*Merops apiaster*), que se expandirían por toda Europa.

O informe calcula que se as especies son perfectamente capaces de se mover co clima, en Europa extinguiríanse en torno o 9 por cento, pero se non o son, poderían chegar a extinguirse ata o 40 por cento das especies. Ademais, a restrición da área de distribución das aves suporá un novo problema para os esforzos conservacionistas. Para

SÍMFOLIO DA ESTIVADA NAI XELO SONA
A TAVADELLA. A AGUATIVA FERIA ESTÁN
A AXUNTAS DE ESTIVADA NO CEGAL

produtoras en Europa, que foi presentado recentemente, e que compara os actuais e as futuras condicións favorables para as diferentes especies de aves que crecen en o simulo do quecemento global.

dades británicas de Durham e Cambridge Brian Liu, Helen Thys Greet, Vicki, Colli, Graham e Steve Willis.

Ademais, outros casos de espécies endémicas de Europa mais ameaçadas polo quecemento global so-

insectos de que se alimentan nin a flora". Tamén propón mellorar as condicións dos hábitats para posibilitar que acollan as especies que se espera que se trasladen ata eles e para facelos máis resistentes ó quecemento global, evitando así a súa desaparición e a das aves ás que acubillan. "Un aciñeiral pode resistir 50, 100 ou 200 anos a un clima adverso, e iso caríños tempo para tomar medidas urxentes" que resolván o problema do quecemento, apunta Alejandro Sánchez.